

## المنتج 'إيفرجالين'

المؤشرات العلاجية: علاج الجرب القارمي لدى الإنسان.  
التركيب: يحتوي كل قرص على 3 ملغ من 'إيفرمكتين'  
الشكل: 4 أقراص

### نشرة البيانات

### نصيحة للمرضى

#### مقدمة

الجرب هو غزو طفيلي للجلد يسببه 'ساركوبتيس سكايبى'. يصيب هذا الجرب الإنسان على وجه التحديد. وتتسبب بروتينات العث والبقايا التي ينتجها في تفاعل فرط الحساسية الذي يسبب حكة شديدة تزداد شدتها في الليل.

#### طريقة الانتقال

- ينتقل الجرب عن طريق اللمس المباشر للجلد بين الأشخاص حيث ينتقل العث عبر الجلد. يجب أن يكون الاتصال الجلدي طويلًا، وهذا يعني أنه من الصعب انتقال هذا المرض من خلال المصافحة السريعة أو العناق. ومع ذلك، يمكن أن ينتقل بسهولة بين أفراد الأسرة والشركاء الجنسيين.
- في الأماكن التي يعيش فيها العديد من الأشخاص معًا في أماكن مغلقة، مثل دور رعاية المسنين ودور الحضانه ومراكز الاستقبال والسجون والمستشفيات، يكون انتقال العدوى أمرًا سهلاً. يمكن أيضًا أن ينتشر الجرب عن طريق الاتصال غير المباشر والمطول من خلال الأشياء، مثل الملابس والمناشف والأفرشة.
- لإكمال دورة حياته، يتطلب العث جلد بشري عندما يتطفل على الإنسان، يمكن أن يعيش من شهر إلى شهرين على الرغم من عيشه خارج المضيف، لا يعيش العث أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام في درجة حرارة الغرفة.
- يقاوم العث البرد والرطوبة العالية بشكل جيد. لا يمكن أن يعيش لأكثر من عشر دقائق في 50 درجة مئوية. و يمكن للفرد المصاب أن ينقل الجرب حتى لو لم تظهر عليه أعراض.

#### فترة الحضانه

تبلغ الفترة بين الإصابة وظهور الأعراض حوالي أسبوعين، على الرغم من أن هذه الفترة يمكن أن تمتد إلى ستة أسابيع، خاصة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها الشخص من المرض لأن التحسس للطفيليات يكون أبطأ وتظهر الحكة لاحقًا. في حالة عودة الإصابة، تظهر الحكة بشكل أسرع، من يوم إلى أربعة أيام من إعادة التعرض للمرض.

### فترة الانتقال

- يصبح الشخص المصاب على الفور مصدرًا محتملاً لانتقال العدوى إلى الآخرين، حتى في حالة عدم ظهور الأعراض. تبدأ فترة الانتقال من اللحظة الأولى للإصابة حتى يتم تدمير العث والبيض عن طريق العلاج. تعتبر الملابس التي كانت تلامس الشخص المصاب مصدر خطر محتمل للانتقال حتى يتم علاجها أو حتى مرور سبعة أيام على آخر استخدام لها.
- لا يعود المرض قابلاً للانتقال بعد 24 ساعة من بدء العلاج الأول بمبيدات القراد.
- يجب على الأشخاص المصابين تجنب العلاقات الحميمة أو الجنسية حتى يتم الانتهاء من العلاج ويكون فعالاً. استخدام الواقي الذكري لا يمنع انتقال الجرب.

### العلاج

- يجب إعطاء العلاج لجميع الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى والذين ظهرت عليهم أعراض المرض والأشخاص المخالطين لهم والذين لم تظهر عليهم أية أعراض، والذي قد يشمل الأشخاص الذين يعيشون معهم، والمتصلين بهم جنسيا وخاصة أي شخص كان على اتصال جلدي مباشر وطويل مع الشخص المصاب خلال الشهر السابق لظهور الأعراض.
- يجب إعطاء العلاج لجميع الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى ومخالطيهم في نفس الوقت (خلال فترة 24 ساعة) لتجنب الإصابة مرة أخرى. من المهم أن تتذكر أنه في المرة الأولى التي يصاب فيها الشخص بالجرب، عادةً لن تظهر عليه أي أعراض خلال أول أسبوعين إلى ستة أسابيع، ولا يزال بإمكانه نقل الجرب خلال هذه الفترة.
- يجب معالجة الشركاء والأشخاص المخالطين لهم المعرضين للخطر دون أن تظهر عليهم أعراض بجرعة من 'الإيفرمكتين' الفموي لأنهم قد يكونون في فترة الحضانة.

### التدابير البيئية (1):

- يجب تطبيق هذه التدابير في نفس الوقت مع تدابير العلاج والمراقبة الأخرى في غضون 24 ساعة من تشخيص الجرب:
- تطهير الملابس الداخلية والمفروشات والملاءات والمناشف ودمى الحيوانات وما إلى ذلك والتي استخدمها المصاب خلال السبعة أيام قبل تطبيق العلاج وأي استخدام أثناء ذلك.
- يجب وضع جميع الملابس التي يمكن غسلها وحملها في كيس بلاستيكي مع التأكد من وضعها مباشرة في الغسالة لتجنب تلويث الأسطح الأخرى.
- يجب غسل الملابس بالماء الساخن (عشر دقائق على الأقل في 50 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية وتجفيفها لمدة 20 دقيقة أو تنظيفها بالجاف في دورة ساخنة) لقتل العث.
- يجب تغيير جميع الأفرشة والمناشف والملابس يوميًا.
- الملابس أو المواد التي لا يمكن غسلها في الغسالة أو تنظيفها بالجاف (مثل الأحذية والمعاطف والبطانيات وغيرها) يجب وضعها مباشرة في كيس بلاستيكي مغلق بإحكام لمدة سبعة أيام حتى يموت العث والبيض.
- يجب على جميع الموظفين الذين يجمعون و / أو يغسلون ملابس الشخص المصاب ارتداء عباءة بأكام طويلة وقفازات يمكن التخلص منها.

- يجب التخلص من جميع الكريمات والمستحضرات ومنتجات البشرة الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابون بالجرب قبل بدء العلاج.

### التدابير البيئية (2):

- التنظيف العام للمراتب والوسائد والأثاث المنجد والسجاد ومقاعد السيارات يتم باستخدام الماء والصابون لضمان الوصول إلى جميع الزوايا. يجب بعد ذلك تفرغ المنطقة تمامًا. استخدام المكنسة الكهربائية يسهل التخلص من البيض والعث. على الأسطح النسيجية مثل الوسائد أو الكراسي بذراعين، استخدم المكنسة الكهربائية بفوهات صغيرة لزيادة الشفط. يجب تغيير كيس المكنسة الكهربائية والمرشحات بعد كل استخدام.

- التنظيف والتطهير الروتيني بالمبيض لأسطح الأثاث التي لمسها المريض. في مثل هذه الأسطح (على سبيل المثال، الكراسي البلاستيكية)، قد يكون من المستحسن استخدام أنظمة التنظيف بالبخار حيث يمكن الوصول إلى درجات حرارة تزيد عن 120 درجة مئوية. يمكن أن تكون هذه الأنظمة مفيدة أيضًا عند تنظيف الأغذية البلاستيكية للمراتب والوسائد وما إلى ذلك والتي كان يلمسها الشخص المصاب، إذا كان ذلك ممكنًا.

- التنظيف بالبخار ليس ضروريًا.

- نظرًا لأن أعراض الجرب ناتجة عن تفاعل فرط الحساسية تجاه العث وبرازها، فإن الحكة تقل عادةً بعد يوم أو يومين من العلاج. يمكن أن تستمر بكثافة أقل لعدة أسابيع، على الرغم من موت كل العث والبيض. ينصح باستخدام كريمات الترطيب، وكذلك الحفاظ على البشرة نظيفة وجافة.

شكر وتقدير: الدكتور كونستانزا ريكيلمي، طبيب الأمراض الجلدية MD مستشفى 'كلينيك دي برشلونة'، والطبيب 'سيباستيان بودلينيك'، طبيب الأمراض الجلدية، حاصل على الدكتوراه، مستشفى 'كلينيك دي برشلونة'.